

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/236593357>

BENSACI E., SAHEB M., CHERIEF-BOUTERAA N., CHERIEF A., QNINBA A. & HOUHAMDI M. 2012. Un second cas de nidification de la Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* en Algérie. Alaud...

Article in Alauda · January 2012

CITATIONS

0

READS

404

6 authors, including:



Ettayib Bensaci

Université de M'Sila

57 PUBLICATIONS 337 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Menouar Saheb

Larbi Ben M'hidi University of Oum El Bouaghi

72 PUBLICATIONS 541 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Abdelkader Cherief

10 PUBLICATIONS 34 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Abdeljebbar Qninba

Mohammed V University

251 PUBLICATIONS 1,329 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

**4049: UN SECOND CAS DE NIDIFICATION
DE LA MOUETTE RIEUSE *Chroicocephalus*
ridibundus EN ALGÉRIE**

A second breeding evidence of Black-headed Gull *Chroicocephalus ridibundus* in Algeria. In May 2010 at Dayet El-Kerfa (Hauts-Plateaux, Algeria), 2 nests of Black-headed Gull were found in a mixed colonies of Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*, Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* and Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*. In the same year, another nest was found in a mixed colony of Collared Pintail *Glareola pratincola* and Pied Avocet.

Mots clés: *Chroicocephalus ridibundus*, Reproduction, Dayet el-Kerfa, Hauts plateaux, Algérie.

Keys words: *Chroicocephalus ridibundus*, Reproduction, Dayet el-Kerfa, Hauts plateaux, Algeria.

Introduction

La Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* est une espèce cosmopolite dont l'aire d'hivernage principale couvre la Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne et les régions littorales du Sud-Ouest de l'Asie et l'Afrique du Nord (CRAMP & SIMMONS, 1983). L'aire de nidification et les effectifs reproducteurs de la Mouette rieuse ont connu une grande expansion en Europe depuis la fin du XIX^e siècle. Cette expansion avait atteint le continent africain en 2002 quand une colonie reproductrice s'est installée à partir de cette année-là sur le lac de barrage d'Al-Massira au Maroc central (RADI *et al.*, 2004; THEVENOT *et al.*, 2004). Il y eut un deuxième cas de nidification à Bas Loukkos (QNINBA *et al.*, 2008), puis un troisième en 2010 à Seb-kha Zima (M. RADI, com. pers.).

PHOTO II.— Nid avec 4 œufs de Mouette rieuse.
Nest of Black-headed Gull.



En Algérie, où l'espèce est présente surtout en hivernage, elle fréquente les zones humides côtières et les hauts plateaux ainsi que parfois les zones humides sahariennes (ISENMANN & MOALI, 2000).

Pour ce qui concerne la nidification, SAHEB (2009) a signalé une tentative de nidification en 2006 dans la Garaet de Guellif sur les Hauts plateaux de l'Est algérien. MOULAY-MELANI *et al.* (2011) découvrent en mai 2006, une petite colonie de Mouette rieuse sur un lac naturel (Dayet El Ferd), à l'extrême Nord-Ouest de l'Algérie.

C'est en mai 2010, parmi les colonies d'autres Laro-limicoles (Goéland railleur *Larus genei*, Sterne hansel *Sterna nilotica*, Avocette élégante *Recurvirostra*

PHOTO I.— Îlot de reproduction de la Mouette rieuse.
Nesting islet of Black-headed Gull.



avosetta, Échasse blanche *Himantopus himantopus*...), que nous allons découvrir deux nids de Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* à Dayet El Kerfa (35°37.191'N, 02°52.604'E) qui est une dépression endoréique de plus de 600 ha, située à 10 km au Sud de Boughzoul et à environ 30 km au Nord d'Ain Ouessara. Cette daya d'eau saumâtre est surtout alimentée par les affluents du bassin versant. Elle compte sept îlots de structure et de dimensions différentes.

Ces nids, qui ne contenaient pas d'œufs lors de la visite du 17 mai 2010, avaient été confondus avec ceux de la Sterne hansel. La date de ponte des œufs de la Mouette rieuse de ces deux nids s'est située entre le 17 et le 19 mai.

Les deux nids étaient installés près d'une colonie mixte de Sterne hansel (90 nids), d'Avocette élégante (42 nids) et d'Échasse blanche (10 nids) à une distance de 6 m par rapport à la berge nord de l'îlot et espacés de 2,7 m. Un troisième nid renfermant deux œufs a été trouvé le 22 mai 2010 au niveau de l'îlot 3. Ce nid était situé à 3 m de la berge, près d'une dizaine de nids de Glaréole à collier *Glaucoloba pratincola* et d'une colonie de 30 nids d'Avocette élégante. Tous ces nids étaient installés sur des îlots de nature argilo-sablonneuse et sont construits à l'aide de débris de plantes halophytes dominantes ici, probablement *Salicornia fruticosa* et *Salsola fruticosa*.

Cette nidification de la Mouette rieuse est considérée comme le deuxième cas confirmé pour l'Algérie et le cinquième cas pour l'Afrique.

Ettayib BENSACI⁽¹⁾, Menouar SAHEB⁽²⁾, Nacéra CHERIEF-BOUTERAA⁽¹⁾, Abdelkader CHERIEF⁽³⁾, Abdeljebbar QNINBA⁽⁴⁾ et Moussa HOUHAMDI⁽⁵⁾

⁽¹⁾Département de SNV, Université de M'sila (Algérie) - ⁽²⁾Département SNV, Université d'Oum El Bouaghi (Algérie) - ⁽³⁾Département d'Agronomie, Université de M'sila (Algérie) - ⁽⁴⁾Institut Scientifique, Université Mohamed V, Rabat (Maroc) - ⁽⁵⁾Département de Biologie, Université de Guelma (Algérie)

Courriels : bensacitayeb@yahoo.fr / houhamdimoussa@yahoo.fr

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier vivement toutes les personnes qui nous ont aidés pendant nos travaux sur terrain, principalement M. Abdelatif GASMI (Conservateur des forêts de la wilaya de Batna) et M. Abdelatif LADGHAM-CHIKOUCHE (ex-directeur adjoint de la Conservation des forêts de la wilaya de M'sila et actuel Conservateur des forêts de la wilaya de Biskra).

BIBLIOGRAPHIE

- CRAMP (S.) & SIMMONS (K.E.L.) (Eds.) 1983. – *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic*. Vol. 3 : *Waders to Gulls*. Oxford University Press, Oxford. 922 p.
- ISENMANN (P.) & MOALI (A.) 2000. – *Oiseaux d'Algérie / Birds of Algeria*. SEOF, Paris. 336 p.
- MOULAY-MELIANI (K.), MOALI (A.) & ISENMANN (P.) 2011. – Première nidification de la Mouette rieuse *Chroicocephalus (Larus) ridibundus* en Algérie. *Alauda*, 79 : 79.
- RADI (M.), QNINBA (A.), DAKKI (M.) & THÉVENOT (M.) 2004. – Nidification de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* et de la Sterne hansel *Sterna nilotica* dans le lac de barrage d'Al Massira (Maroc central). *Alauda*, 72 : 53-58.
- SAHEB (M.) 2009. – *Écologie de la reproduction de l'Échasse blanche Himantopus himantopus et de l'Avocette élégante Recurvirostra avosetta dans les hautes plaines de l'Est-algérien*. Thèse de Doctorat en Écologie et Environnement. Université d'Annaba, 147 p.
- THÉVENOT (M.), RADI (M.), QNINBA (A.) & DAKKI (M.) 2004. – First proven breeding record of the Black-headed Gull *Larus ridibundus* in Africa. *Alauda*, 72 : 59-61.

OISEAUX D'ALGÉRIE

A. Moali & P. Isenmann 332 pages, 115 photographies, 210 cartes

Ce livre bilingue Français-Anglais est avant tout une liste commentée des 406 espèces d'oiseaux (dont 213 sont nicheuses) recensées jusqu'en 1999 en Algérie qui est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Cet ouvrage fournit des informations sur les principaux paysages rencontrés, un catalogue des espèces d'oiseaux, une analyse biogéographique des oiseaux nicheurs et situe la place de ce pays dans le système des migrations paléarctiques et transsahariennes. La liste commentée donne les détails disponibles sur le statut, la phénologie, la distribution, l'habitat et la reproduction des différentes espèces. Le livre s'achève sur une importante bibliographie et un index des localités géographiques.

36,60 € (plus frais de port)

A commander à MNHN-SEOF, Case postale 51, 55 rue Buffon,
F-75231 Paris Cedex 05

